# PRODUCTION OF SUBSTANCE HAVING ANTIBACTERIAL EFFECT OF APICULTURE USING THE SUBSTANCE

Patent number:

JP2000333619

Publication date:

2000-12-05

Inventor:

IZENA NOBUYUKI; IZENA HIDEKO

Applicant:

IZENA NOBUYUKI;; IZENA HIDEKO

Classification:

- international:

A23K1/18; A23K1/16; A61K31/00; A61K35/64

- european:

Application number:

JP19990150583 19990528

Priority number(s):

## Abstract of JP2000333619

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce a substance having antibacterial effect from the constituting material of a tunnel living a stag beetle larva, excrement of the larva, the

larva itself, etc.

SOLUTION: The objective substance having antibacterial effect can be produced by fermenting a sugar syrup having a concentration of 10-30% with larva of stag beetle, a nest material of stag beetle larva such as rotted wood chips mixed with secretion and excrement of stag beetle larva and microorganisms living in the above material. The disease of honey-bee can be cured and the growth of bee is improved by feeding a honey-bee with a feed mixed with the antibacterial substance.

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-333619

(P2000-333619A)

(43)公開日 平成12年12月5日(2000.12.5)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
A 2 3 K	1/18		A 2 3 K 1/18	Z 2B005
	1/16	304	1/16	304A 2B150
A61K	31/00	6 3 1	A 6 1 K 31/00	631A 4C087
	35/64		35/64	
			数本競· 土競· 中	競争項の数4 〇1 (今 4 頁)

(21)出願番号	特顧平11-150583	(71)出願人	598067968
			伊是名 信行
(22)出願日	平成11年5月28日(1999.5.28)		沖縄県国頭郡本部町字大浜864
		(71) 出願人	598067979
			伊是名 英子
			沖縄県国頭郡本部町字大浜864
•		(72)発明者	伊是名 信行
		•	沖縄県国頭郡本部町字大浜864
		(72)発明者	伊是名 英子
			沖縄県国頭郡本部町字大浜864
		(74)代理人	100076082
			弁理士 福島 康文

最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 抗菌効果物質の製造方法並びに抗菌効果物質を用いた養蜂方法

#### (57)【要約】

【課題】クワガタ幼虫の排泄物や分泌物、クワガタ幼虫 などを利用して抗菌効果物質を得る技術に関し、クワガ タ幼虫の生息する坑道を構成する巣の材料や排泄物、幼 虫などから抗菌効果物質を生産可能とする。

【解決手段】クワガタ幼虫またはクワガタ幼虫が出した 分泌物や排泄物の混ざった腐朽木くず等の巣の材料、と れらに共生する微生物などを利用して、濃度10%~3 0%の糖液で発酵させて抽出することで、抗菌効果物質 を製造する。との抗菌効果物質をミツバチの餌に混ぜて 給餌すると、ミツバチの病気を治癒でき、発育も良好と なる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 クワガタ幼虫またはクワガタ幼虫が出し た分泌物や排泄物の混ざった腐朽木くず等の巣の材料、 これらに共生する微生物などを利用して、糖分を含む発 酵液で発酵させて抽出してなることを特徴とする抗菌効 果物質。

1

【請求項2】 クワガタ幼虫またはクワガタ幼虫が出し た分泌物や排泄物の混ざった腐朽木くず等の巣の材料、 これらに共生する微生物などを利用して、糖分を含む発 酵液で発酵させて抽出することを特徴とする抗菌効果物 10 質の製造方法。

【請求項3】 前記の発酵液が、濃度10%~30%の 糖液であることを特徴とする請求項2に記載の抗菌効果 物質の製造方法。

【請求項4】 クワガタ幼虫またはクワガタ幼虫が出し た分泌物や排泄物の混ざった腐朽木くず等の巣の材料、 これらに共生する微生物などを利用して、糖分を含む発 酵液で発酵させて抽出してなる抗菌効果物質を、ミツバ チの餌に混ぜて給餌することを特徴とする抗菌効果物質 を用いた養蜂方法。

#### 【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】本発明は、クワガタ幼虫の排 泄物や分泌物、クワガタ幼虫などを利用して抗菌効果物 質を得る技術に関する。

【従来の技術と発明が解決しようとする課題】本発明の 発明者は、特願平10-142370号として、椎茸栽 培に利用された後の腐朽原木を利用してクワガタを大量 に養殖する技術を発明し、特許出願してある。

【0001】発明者は、このようにクワガタ養殖を研究 している間に、クワガタ幼虫の生息している場所の付近 30 には抗菌効果のあることを発見した。すなわち、クワガ タ幼虫は、生活の場が腐朽木に限られているが、害虫や 害菌などの防除のために、排泄物木くずを細かく加工処 理して、住処となるトンネル(坑道)を築き、害虫や害 菌などから身を防護する性質がある。

【0002】このように、クワガタ幼虫の排泄物などが 混じった腐朽木くず自体に、害虫などを防除できる抗菌 効果があるように思われた。

【0003】しかしながら、害虫防除にはなっても、害 菌を防ぐことができるのか?。坑道を作るとき、幼虫自 40 身が排出したある種の物質か菌でもって、腐朽木を加工 処理した後で、坑道を塞ぎ、抗菌物質でパリヤーを張っ ているのではないか?、と注目した。

【0004】特に、サナギに蛹化する時は、念入りに蛹 室の内部を仕上げている。その理由は、サナギになると 抗菌物質を出す能力がなくなり、害菌の影響を受け易く なるから、前もって入念にバリヤーを張っているものと 思われる。

【0005】以上のようなことから、クワガタ幼虫が坑

物質があるのではないかと考え、この物質の特性を確認 するとともに、この物質の抽出、生産方法を追求するこ とにした。

【0006】本発明の技術的課題は、このような問題に 着目し、クワガタ幼虫の生息する坑道を構成する巣の材 料や排泄物、幼虫などから抗菌効果物質を生産すること にある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の技術的課題は次 のような手段によって解決される。請求項1は、クワガ タ幼虫またはクワガタ幼虫が出した分泌物や排泄物の混 ざった腐朽木くず等の巣の材料、これらに共生する微生 物などを利用して、糖分を含む発酵液で発酵させて抽出 してなることを特徴とする抗菌効果物質である。クワガ タ幼虫の分泌物や排泄物に抗菌効果があるということ は、クワガタの幼虫自体にも抗菌効果のある物質が含ま れていると解釈でき、しかも実験の結果、間違いが無か ったので、クワガタ幼虫自体からも抗菌効果物質が得ら れる。

【0008】このように、クワガタ幼虫またはクワガタ 20 幼虫が出した分泌物や排泄物の混ざった腐朽木くず等の 巣の材料、これらに共生する微生物などを、糖分を含む 発酵液で発酵させて抽出した物質は、抗菌効果にすぐれ ており、特にミツバチなどの生育を阻害する害菌やダニ 等の防止に有効である。

【0009】請求項2は抗菌効果物質の製造方法の発明 であり、クワガタ幼虫またはクワガタ幼虫が出した分泌 物や排泄物の混ざった腐朽木くず等の巣の材料、これら に共生する微生物などを利用して、糖分を含む発酵液で 発酵させて抽出する。

【0010】とのように、クワガタ幼虫またはクワガタ 幼虫が出した分泌物や排泄物の混ざった腐朽木くず等の 巣の材料、これらに共生する微生物などを利用して、糖 分を含む発酵液で発酵させて抽出することによって、抗 菌効果物質を効果的かつ大量に製造できる。

【0011】請求項3は、請求項2に記載の発酵液が、 濃度10%~30%の糖液である抗菌効果物質の製造方 法である。抗菌効果物質の抽出、製造のための発酵液と してはいろいろ有るが、特に濃度10%~30%の糖液 が適していることが確認できた。

【0012】請求項4は、クワガタ幼虫またはクワガタ 幼虫が出した分泌物や排泄物の混ざった腐朽木くず等の 巣の材料、これらに共生する微生物などを利用して、糖 分を含む発酵液で発酵させて抽出してなる抗菌効果物質 を、ミツバチの餌に混ぜて給餌することを特徴とする抗 菌効果物質を用いた養蜂方法である。

【0013】 このように、クワガタ幼虫やその分泌物、 排泄物などを発酵液で発酵させて抽出した抗菌効果物質 をミツバチの餌に混ぜて与えると、ミツバチの病気など 道を防護するための腐朽木くずや排泄物などには特別な 50 を効果的に治癒でき、かつ健康増進に有効であることが



確認できた。

[0014]

【発明の実施の形態】次に本発明による抗菌効果物質の 製造方法並びに抗菌効果物質を用いた養蜂方法が実際上 どのように具体化されるか実施形態を説明する。

3

【0015】まず、クワガタの幼虫が加工処理した木くず排泄物を、糖分濃度が10%~30%の糖液につけてむと、よく発酵した。夏場だと、30日程度発酵させた後、使用する。冬場だと、50日程度おいて発酵させる。こうして発酵させた液を、ミツバチの給餌用糖液ま 10たは代用花粉に対し5~10%(容積比)の割合で混合して蜜蜂に与える。

【0016】ミツバチダニや病気におかされて死んだ幼虫と産卵が疎らになった巣において、平成10年9月から、前記のように5%程度の発酵液を混ぜた餌を与えた。また、代用花粉にも5%程度混ぜて与えた。

[0017] とのようにして、3ヵ月間、3日~5日でとに1回与えたところ、病気が改善され、ダニも居なくなって、巣全体が改善された。その結果、女王蜂は産卵が活発になり、若バチが多くなった。普通のミツバチの2倍から3倍のスピードで蜂が増えるので、花粉や蜜が不足しないように注意を要するほどだった。

[0018] とうしてミツバチが繁殖し、平成11年1月現在で、15枚群を作ることに成功した。なお、普通は1群当たり5枚であるから、本発明の抗菌効果物質の効果が甚大であることが認められた。

【0019】この抗菌効果物質は、腐敗防止にも有効であった。その確認のために、腐敗発酵してカビや雑菌が繁殖し腐敗臭のある残飯を用いた。

【0020】この残飯に、本発明の糖分濃度10%の培 30 養液を、生ゴミ1リットルにつき100グラムの割合で 投入し、攪拌した。抗菌効果物質を入れないで、放置し たものは、腐敗発酵して悪臭が発生したが、抗菌効果物 質を加えた方の残飯は、腐敗が止まり、不快臭もほとん ど生じなかった。

【0021】抗菌効果物質を加えないために悪臭の発生した方の残飯に、前記培養液をスプレーしたところ、発酵が停止し、腐敗菌の活動が停止したことが確認できた。その後、そのままの状態で放置しておいたところ、表面が寒天状になり、また不快臭はほとんど感じられな 40 かった。

【0022】以上のことから、クワガタ幼虫のもつ物質や排泄物などを、糖液を用いて発酵させ、抽出した抗菌効果物質を工業的に生産することにより、生ゴミ処理などのように、養蜂以外にも適用でき、用途の拡大が期待できる。

【0023】例えば、生ゴミ、その他の生活廃棄物、産業廃棄物などの腐敗発酵を防止するには、技術と設備を必要とし、費用もかかるが、本発明の抗菌効果物質を利用することで、これらの問題を一掃できる。

[0024] また、下水や河川、養豚場、養鶏場その他の溜まり水などにおいても、腐敗による不快臭を抑制するのにも利用できる。

[0025]なお、発酵液として糖液を用いたが、澱粉液や大豆粉などの液に糖分を混ぜて使用することもできる。

[0026]

【実施例】本発明による発酵抽出液を作るには、容器の 形はほとんど関係ないが、取り扱い上、広口ピンなどが よい。

【0027】クワガタ幼虫が加工した腐朽木くずなどを取り出して、濃度が10%~30%の糖液を、全量の10%~20%の割合で加えて、30日程度表面発酵させる。次第にガスが発生してくるので、蓋はゆるくしておく。

[0028] 3日~5日に1回程度、ゆっくり上下に振る。全体が褐色ないし黄金色になると、できあがりである。保管は、太陽光に当てないようにし、夏場は涼しい場所に置く。糖分濃度を10%~30%にするのは、腐敗発酵を防ぐ為にも有効である。完成品は殆ど臭いはないが、果物の発酵に似た臭いが少々ある。

[0029] との発酵抽出液の効果を試験するために、5枚群の病気やダニに侵された他の養蜂家のミツバチをテスト用に借りてきた。蜂の数が少なく、全体的に元気もない。巣の内部を観察すると、蜂の数が少なく、巣全体が凸凹している。さらに、消費されていない花粉が多量に残っており、花粉を食する若バチが育っていないことが分かる。蜂蜜も古く、消費されないので、そのままの状態である。とのようなミツバチでは、春まで管理しても生産性は期待できないどころか、春までもつか、どうかである。

[0030] 蜂全体が弱っているので、蜂蜜と本発明の発酵抽出液とを8対2の割合で代用花粉に混合し、糠状にして3日に1回与えた。量は、当初10グラム $\sim 15$ グラム位にした。10日位して、蜂が元気になると、15グラム $\sim 30$ グラムに増やした。同時に、新たな糖液にも発酵液を10%程度混合して与えた。

【0031】30日後、病気に対して耐性ができた結果、産卵も活発になり、蜂も増え続け、現在8枚群まで増えている。働き蜂を活発にして、女王蜂の産卵を促す作用があるからだ。また、ダニの発生は全く見えず、防虫効果が確認できた。なお、12月~翌2月の気候で蜂が増えるのは他に例がない。

【0032】普通のミツバチは、冬1月~2月では、5枚群を維持するのにも特別な努力や工夫を必要とし、各養蜂家が苦心するところである。ところが、本発明の培養液を5%~10%餌に混入するだけで、1月~2月の時点で8枚~15枚群を作れるので、3月からはすぐに操業でき、花粉や蜂蜜、ローヤルゼリー、種蜂などのよ50方なミツバチ生産物の収量増大が期待できる。

【0033】株式会社トロピカルテクノセンターにて、 本発明の方法で製造した抗菌効果物質自体の微生物検査 を行なった結果、一般細菌数は4.3×10'、乳酸菌数 は3.6×10°、放線菌数は0、糸状菌数は0、酵母数 は7.4×103、大腸菌数は陰性であった。なお、菌数 は(cfu/m1)で表した。

【0034】試験に際しては、試料液のpHを測定する と、試料が酸性であるため、以下の前処理を行なった。 すなわち、試料50m1を濾過滅菌用フィルターで濾過 した。瀘過終了後のフィルターを滅菌したリン酸緩衝液 10 に入れて十分混和し、試料原液とした。この液を適宜希 釈して、各菌の選択培地に接種後、それぞれの条件で培 養後に発生した集落を数えた。

\*【0035】また、財団法人日本食品分析センターにお いて、本発明による抗菌効果物質を検体とし、細菌を添 加して、その消長を調べたところ、表1のような結果が 得られた。なお、試験方法は、検体をメンプランフィル ター (孔径0.45 µm) でろ過滅菌し、試験液とした。 【0036】試験操作は、試験液100mlに菌液1m 1を添加後、35°Cで保存し、保存24時間後の生菌 数をSA培地を用いた寒天平板培養法(35° C, 2日 間培養)により測定した。また、対照として、1/50 ONB培地に菌液を添加したものについても同様に試験 Utc.

[0037]

【表1】

#### 試験液に添加した試験菌の生菌数測定結果

試験菌	測定対象	試験液1m1当たりの生菌数		
6人級突 图		保存開始時*	2 4 時間後	
-1-88 177	検体	3.3 × 10 <sup>5</sup>	<10	
大腸菌	対照	$3.3 \times 10^5$	$9.2 \times 10^8$	
黄 色	検体	2.3 × 10 <sup>5</sup>	<10	
ブドウ球菌	別快	2.3 × 10 <sup>5</sup>	$1.6 \times 10^{5}$	

<10: 検出せず

\*菌液の生菌数を測定し、試験液1m1当たりに換算した。

#### [0038]

【発明の効果】請求項1のように、クワガタ幼虫または クワガタ幼虫が出した分泌物や排泄物の混ざった腐朽木 くず等の巣の材料、これらに共生する微生物などを、糖 分を含む発酵液で発酵させて抽出した物質は、抗菌効果 菌やダニ等の防止に有効である。

【0039】請求項2のように、クワガタ幼虫またはク ワガタ幼虫が出した分泌物や排泄物の混ざった腐朽木く ず等の巣の材料、これらに共生する微生物などを利用し て、糖分を含む発酵液で発酵させて抽出することによっ て、抗菌効果物質を効果的かつ大量に製造できる。

【0040】抗菌効果物質の抽出、製造のための発酵液※

※としてはいろいろ有るが、請求項3のように、特に濃度 10%~30%の糖液が、抗菌効果物質の大量抽出に適 しており、量産が可能となる。

【0041】請求項4のように、クワガタ幼虫やその分 泌物、排泄物などを発酵液で発酵させて抽出した抗菌効 にすぐれており、特にミツバチなどの生育を阻害する害 30 果物質をミツバチの餌に混ぜて与えると、ミツバチの病 気などを効果的に治癒でき、かつ健康増進に有効であ

> 【0042】近年、異常気象による髙温多湿、冷害等に より、ミツバチの病気や害虫による被害が甚大となり、 養蜂業を続けるのが困難になりつつあるが、本発明の抗 菌効果物質を用いることによって、このような事態を回 避可能となる。

#### フロントページの続き

Fターム(参考) 2B005 EA03

2B150 AA20 AB20 AD01 BB01 CC01 DD01 DD31 4C087 AA02 AA04 AA10 BB21 BB22 CA03 CA06 NA14 ZB35 ZB39

ZC61